

아질렉트® 정 0.5 mg, 1 mg



라사길린메실산염

아질렉트®정은 주성분인 라사길린메실산염 (Rasagiline Mesylate)이며, 2세대 비가역적 선택적 MAO-B (monoamine oxidase type B) 억제제로 작용하는 파킨슨병 치료제입니다. 파킨슨병은 퇴행성 신경질환으로 뇌의 흑질 (substantia nigra)에 분포하는 도파민의 신경세포가 점차 소실되어 발생하는데, 이 약은 신경세포에서 내인성 및 외인성 도파민이 MAO-B 효소에 의해 대사되는 것을 선택적으로 억제하여 뇌 흑질 내 도파민의 농도를 증가 시킵니다. 이러한 선택적 도파민 효력 증강 효과 (enhancement of dopamine activity)를 통해 특발성 파킨슨병에서 치료 효과를 나타냅니다. 아질렉트®정은 파킨슨병 환자에서 초기 단독요법 또는 레보도파나 도파민 효능제의 보조요법으로 사용할 수 있습니다.

원료약품 및 그 분량

- 아질렉트®정 0.5 mg: 이 약 1정 (105 mg) 중
 - 유효성분: 라사길린메실산염(별규) 0.78 mg (라사길린으로서 0.5 mg)
 - 첨가제: 만니톨, 스테아르산, 옥수수전분, 전호화전분, 콜로이드성인산화규소, 탭크
- 아질렉트®정 1 mg: 이 약 1정 (210 mg) 중
 - 유효성분: 라사길린메실산염(별규) 1.56 mg (라사길린으로서 1 mg)
 - 첨가제: 만니톨, 스테아르산, 옥수수전분, 전호화전분, 콜로이드성인산화규소, 탭크

성상

아질렉트®정 0.5 mg: 흰색 면의 위쪽에 "GL", 아래쪽에 "0.5"가 새겨진 흰색 또는 거의 흰색의 모서리가 있는 평평한 원형 정제

아질렉트®정 1 mg: 흰색 면의 위쪽에 "GL", 아래쪽에 "1"이 새겨진 흰색 또는 거의 흰색의 모서리가 있는 평평한 원형 정제

효능·효과

- 특발성 파킨슨병의 치료:
- 초기 단독요법 또는 도파민 효능제의 보조요법
 - 운동 동요 증상(end of dose fluctuations)이 있는 환자에서 레보도파의 보조요법

용법·용량

이 약은 상인체에 단독요법 또는 보조요법으로 1일 1회 경구 투여합니다.
 1) 단독요법 또는 도파민 효능제의 보조요법: 1일 1회 1mg을 경구 투여합니다.
 2) 레보도파의 보조요법: 레보도파를 복용 중인 환자에서 권장되는 초기 용량은 1일 1회 0.5mg입니다. 내약성이 양호하며 충분한 임상적 반응을 보이지 않을 경우 1일 1회 1mg으로 증량할 수 있습니다.
 이 약은 식사와 관계없이 복용할 수 있습니다.

사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 이 약의 주성분 또는 이 약의 다른 성분과 과민성이 있는 환자
 - 다른 MAO (모노아민산화효소) 억제제 (제형 없이 복용 가능한 천연 의약품 (예: St. John's Wort) 포함)을 투여 중이거나 투여 중단 후 2주 이내의 환자 (4, 상호작용 항 참조)
 - 페티딘을 투여 중이거나 투여 중단 후 2주 이내의 환자 (4, 상호작용 항 참조)
 - 트라마돌을 투여 중인 환자 (4, 상호작용 항 참조)
 - 덱스트로메토르판을 투여 중인 환자 (4, 상호작용 항 참조)
 - 중독증 및 중증의 간장애 환자 (3, 일반적 주의 항 참조)

2. 이상반응

임상시험에서 총 1,361명의 환자가 단독요법 또는 레보도파에 보조요법으로서 라사길린을 투여받았습니다.

- 1) 단독요법: 임상시험 I
 위약-대조 시험에서 라사길린 1mg/일을 투여한 환자군에서 더 높은 비율로 나타난 이상반응을 아래 표에 정리하였습니다 (라사길린군 149명, 위약군 151명). 괄호 안에는 라사길린 vs. 위약의 이상반응 발생률 (총 환자 수에 대한 %)을 각각 기재하였습니다. 이상반응은 발생 빈도에 따라 다음 기준에 따라 분류되었습니다: 매우 흔하게(≥1/10), 흔하게(≥1/100, 1/10), 흔하지 않게(≥1/1,000, 1/100), 드물게(≥1/10,000, 1/1,000), 매우 드물게(1/10,000).

감염 (infections and infestations)	기관계	인과관계와 상관없는 중대한 이상사례	인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응
흔하게: 독감* (4.7% vs. 0.7%)		3.87% (26/672명, 30건)	1.34% (9/672명, 10건)
양성·악성 신생물 및 기타 (양종 및 용종)			
흔하게: 피부암(skin carcinoma) (1.3% vs. 0.7%)	근육-골격계 장애	척추골절, 갈비뼈골절, 견손상, 골반골절, 관절염, 다리골절, 상지골절, 허리통증	척추골절, 골반골절
혈액 및 림프계 이상	기타 용어	무릎관절염, 추간판탈출증	-
흔하게: 백혈구 감소증 (1.3% vs. 0%)	대사 및 영양 질환	저혈당증, 체중감소	체중감소
면역계 이상	비노기계 질환	급성신부전, 배뇨곤란	-
흔하게: 알레르기 (1.3% vs. 0.7%)	일반적 심혈관 질환	기립성저혈압	기립성저혈압
대사 및 영양 이상	진신적 질환	악성고열증, 전신쇠약, 폐결핵	-
흔하지 않게: 식욕감소 (0.7% vs. 0%)	정신질환	환각	환각
정신계 이상	중추 및 말초신경계 장애	반혼수, 보행장애, 안구운동발작, 어지러움, 얼굴마비, 척추관협착, 파킨슨증악화	반혼수, 보행장애, 안구운동발작, 어지러움, 파킨슨증악화
흔하게: 우울* (5.4% vs. 2%), 환각 (1.3% vs. 0.7%)	혈관질환	경막하출혈	-
신경계 이상	호흡기계 질환	폐렴	-
매우 흔하게: 두통* (14.1% vs. 11.9%)			
흔하지 않게: 뇌혈관사고(Cerebrovascular accident) (0.7% vs. 0%)			
눈 이상			
흔하게: 결막염* (2.7% vs. 0.7%)			
귀 및 미로계 이상			
흔하게: 어지러움 (2.7% vs. 1.3%)			
심장 이상			
흔하게: 협심증 (1.3% vs. 0%)			
흔하지 않게: 심근경색증 (0.7% vs. 0%)			
호흡기계, 흉부 및 종격동 이상			
흔하게: 비염* (3.4% vs. 0.7%)			
위장관 이상			
흔하게: 고령(Flatulence) (1.3% vs. 0%)			
피부, 피하조직 이상			
흔하게: 피부염* (2.0% vs. 0%)			
흔하지 않게: 수포성발진(vesiculobullous rash) (0.7% vs. 0%)			
근골격계, 결합조직 이상			
흔하게: 근골격통* (6.7% vs. 2.6%), 경부통* (2.7% vs. 0%), 관절염(1.3% vs. 0.7%)			
신장, 요로계 이상			
흔하게: 요질박 (1.3% vs. 0.7%)			
전신 및 투여부위 이상			
흔하게: 발열 (2.7% vs. 1.3%), 권태* (2% vs. 0%)			

*위약과 비교해 2% 이상 차이나는 이상반응

2) 보조요법

(1) 임상시험 II
 라사길린을 투여한 환자군 162명 중 약 8%가, 위약 투여군 164명 중 약 4%가 이상반응으로 인해 시험을 중단하였습니다. 1명보다 많은 환자가 시험을 중단되게 된 이상반응은 구역과 어지러움이었습니다.
 가장 빈번하게 나타난 (라사길린 군에서 위약군보다 발생 빈도가 3% 이상 높았으며) 이상반응은 말초부종, 넘어짐, 관절통, 기침, 불면증 등이었습니다. 레보도파를 사용하지 않는 라사길린 보조요법 시험군에서 2% 이상이 위약군 보다 높은 빈도로 발생했던 이상반응을 아래 표에 나타냈습니다.

	라사길린 1mg (162명 중 %)	위약 (164명 중 %)
어지러움	7	6
말초부종	7	4
두통	6	4
구역	6	4
넘어짐	6	1
관절통	5	2
오통	4	3
기침	4	1
불면증	4	1
상기도감염	4	2
기립성저혈압	3	1

(2) 임상시험 III
 위약-대조 시험에서 라사길린 1mg/일 또는 라사길린 0.5mg/일을 투여한 환자군에서 2% 이상이며 위약군보다 높은 빈도로 발생한 이상반응을 아래 표에 정리하였습니다 (라사길린 1mg/일군 149명, 라사길린 0.5mg/일군 164명, 위약군 159명). 괄호 안에는 라사길린 1mg/일군, 라사길린 0.5mg/일군 및 위약군의 이상반응 발생률 (총 환자 수에 대한 %)을 각각 기재하였습니다.
 이상반응은 발생 빈도에 따라 다음 기준에 따라 분류되었습니다: 매우 흔하게(≥1/10), 흔하게(≥1/100, 1/10), 흔하지 않게(≥1/1,000, 1/100), 드물게(≥1/10,000, 1/1,000), 매우 드물게(1/10,000).

위장관 이상	기관계	인과관계와 상관없는 중대한 이상사례	인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응
매우 흔하게: 구역* (12%, 10%, 8%)		3.87% (26/672명, 30건)	1.34% (9/672명, 10건)
흔하게: 변비* (9%, 4%, 5%), 구토* (7%, 4%, 1%), 입마름* (6%, 2%, 3%), 설사* (5%, 7%, 4%), 복통* (5%, 2%, 1%), 소화불량 (5%, 4%, 4%)			
전신 및 투여부위 이상			
흔하게: 탈장 (2%, 1%, 1%)			
감염 (infections and infestations)			
흔하게: 감염 (3% vs. 2%) 잇몸염 (2% vs. 1%)			

손상, 중독 및 합병증	기관계	인과관계와 상관없는 중대한 이상사례	인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응
매우 흔하게: 사교성손상* (12%, 8%, 5%), 넘어짐(fall)* (11%, 12%, 8%)		3.87% (26/672명, 30건)	1.34% (9/672명, 10건)
신체검사 (investigations)			
흔하게: 체중감소* (9%, 2%, 3%)			
근골격계, 결합조직 이상			
흔하게: 관절통* (6%, 6%, 4%), 경부통* (3%, 1%, 1%), 건조염* (3%, 1%, 0%)			
신경계 이상			
매우 흔하게: 운동이상증* (18%, 18%, 10%), 두통 (11%, 8%, 10%)			
흔하게: 졸림* (6%, 4%, 4%), 감각이상* (5%, 2%, 3%), 운동실조* (3%, 6%, 1%), 근육긴장이상* (3%, 2%, 1%), 근무력증 (2%, 2%, 1%)			
정신계 이상			
흔하게: 식욕부진* (5%, 2%, 1%), 환각* (4%, 5%, 3%), 비정상적인 꿈* (4%, 1%, 1%)			
호흡기계, 흉부 및 종격동 이상			
흔하게: 호흡장애* (3%, 5%, 2%)			
피부, 피하조직 이상			
흔하게: 발진* (6%, 3%, 3%), 탈과다증* (3%, 2%, 1%)			
혈관계 이상			
흔하게: 기립성저혈압* (9%, 6%, 3%), 출혈빈* (5%, 2%, 3%), 출혈 (2%, 1%, 1%)			

* 라사길린 0.5mg/일군 또는 1mg/일군에서 위약과 비교해 2% 이상 차이나는 이상반응

- 임상시험 III 및 IV
 추가적으로 2건의 위약-대조 임상시험을 통과하고 라사길린 1mg/일군(380명)과 위약군(388명)을 비교한 결과, 다음 이상사례들이 추가로 보고되었습니다: 흑색증 (0.5% vs. 0.3%), 식욕감소 (2.4% vs. 0.8%), 착란 (0.8% vs. 0.5%), 수근관 증후군 (Carpal tunnel syndrome) (1.3% vs. 0%), 균형장애 (1.6% vs. 0.3%), 뇌혈관사고 (0.5% vs. 0.3%), 협심증 (0.5% vs. 0%), 괄호 안에는 라사길린 1mg 및 위약군의 이상반응 발생률 (총 환자 수에 대한 %)을 각각 기재하였습니다.

- 3) 시판 후 이상반응
 다음의 이상반응들은 불특정된 규모의 집단에서 자발적으로 보고되었기 때문에 빈도를 확실히 추정하거나 이 약의 노출과의 인과관계를 확립하는 것이 항상 가능하지는 않습니다.
 - 환각 및 착란은 파킨슨병과 관련이 있는 증상입니다. 시판 후 경험에서 이 약을 복용한 파킨슨병 환자에서도 이러한 증상이 나타났습니다.
 - 시판 후 조사 기간 동안, 이 약을 복용한 환자에서 혈압상승 사례가 보고되었습니다 (타이린이 풍부하게 함유된 음식을 알 수 없는 양 섭취한 것과 관련된 고혈압 위기 발생의 드문 경우 포함).
 - 도파민 효능제 및 다른 도파민성 치료제를 복용하는 환자에서 병적 도박, 성욕 증가, 성욕과다증, 강박적 소비 또는 구매, 폭식, 강박적 성식이 나타날 수 있습니다. 이 약의 시판 후 보고서에 강박 행동, 강박적 사고, 충동적 행동을 포함한 충동조절장애와 유사한 양상이 보고되었습니다 (3, 일반적 주의 참고).
 - 이 약을 레보도파와 함께 사용한 몇몇 사례에서 저혈압 사례가 보고되었습니다 (3, 일반적 주의 참고).
 - 도파민 효능제 및 다른 도파민성 치료제를 복용하는 환자에서 낮 시간 동안의 과도한 졸음(과다수면, 졸음, 기면, 진정, 수면발작 및 갑작스런 수면)이 나타날 수 있습니다. 이 약을 도파민성 치료제와 함께 사용했을 때 임상적인 활동 도중 수면에 빠지는 사례들이 보고되었습니다. 이 중 다수의 환자들에서는 이 약과 도파민성 치료제를 함께 복용하면서 졸음을 경험했음이 보고되었으나, 일부 환자들은 과도한 졸림과 같은 경고성 사전증상이 없었으며 해당 사례를 겪기 직전까지도 본인들은 주의력을 잃지 않고 있다고 인지하고 있었었습니다. 이러한 사례들 중 일부는 치료 시작으로부터 1년 이상이 경과한 후에 발생하였습니다 (3, 일반적 주의 참고).
 - 페티딘과 병용시, 급성신부전을 동반한 악성고열증이 국내 시판 후 조사에서 보고되었습니다.
 - 이 약의 시판 후 조사에서 흑색증이 보고되었습니다.

4) 국내 시판 후 조사결과

국내에서 제1시기를 위하여 6년 동안 672명을 대상으로 실시한 사용성적조사 결과, 이상사례의 발생률은 인과관계와 상관없이 38.84% (261/672명, 438건)으로 보고되었습니다. 이 중 인과관계와 상관없는 중대한 이상사례 및 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응을 발한 빈도에 따라 아래 표에 나타냈습니다.

발현빈도	기관계	인과관계와 상관없는 중대한 이상사례	인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응
		3.87% (26/672명, 30건)	1.34% (9/672명, 10건)
흔하지 않게 (0.1% 이상 ~1% 미만)	근육-골격계 장애	척추골절, 갈비뼈골절, 견손상, 골반골절, 관절염, 다리골절, 상지골절, 허리통증	척추골절, 골반골절
	기타 용어	무릎관절염, 추간판탈출증	-
	대사 및 영양 질환	저혈당증, 체중감소	체중감소
	비노기계 질환	급성신부전, 배뇨곤란	-
	일반적 심혈관 질환	기립성저혈압	기립성저혈압
	진신적 질환	악성고열증, 전신쇠약, 폐결핵	-
	정신질환	환각	환각
	중추 및 말초신경계 장애	반혼수, 보행장애, 안구운동발작, 어지러움, 얼굴마비, 척추관협착, 파킨슨증악화	반혼수, 보행장애, 안구운동발작, 어지러움, 파킨슨증악화
	혈관질환	경막하출혈	-
	호흡기계 질환	폐렴	-

또한, 인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례와 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물 이상반응을 발한 빈도에 따라 다음의 표에 나타냈습니다.

발현빈도	기관계	인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례	인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응
		20.68% (139/672명, 179건)	11.16% (75/672명, 90건)
흔하지 않게 (0.1% 이상 ~1% 미만)	간 및 담도계 질환	SGPT증가, 예스지오티증가	-
	근육-골격계 장애	근육통, 갈비뼈골절, 골다공증, 상지골절, 척추골절, 견손상, 골반골절, 다리골절, 팔다리시약	근육통, 갈비뼈골절, 척추골절, 골반골절, 팔다리시약
	기타 용어	뇌진탕, 무릎관절염, 상사불명 의할과상, 찢김상자, 척추증, 만증, 추간판탈출증, 피부부딪기	상사불명 의할과상, 척추측만증
	대사 및 영양 질환	갈증, 저혈당증, 저알부민혈증, 전해질이상	갈증
	비노기계 질환	배뇨곤란, 혈뇨, 급성신부전, 빈뇨, 소변량부족, 야간뇨, 요실금	혈뇨, 빈뇨
	생식기능 장애(여성)	질염	-
	시각장애	안구충혈, 복시, 비문증, 시각장애	안구충혈, 복시, 시각장애
	신생물	피부비대	-
	심장 박동 장애	두근거림, 부정맥	두근거림
	흔하지 않게 (0.1% 이상 ~1% 미만)	위장관계 장애	위장불편, 가스역류, 과다침묵, 과민성대장증후군, 구역질, 배변횡수증가, 상사불명 의할과상, 위장저질환, 식도염, 위산과다, 위식도역류, 위저류, 위장염, 장운동장애, 치주염, 헬리코박테리아로리류염
적혈구장애		빈혈	-
전신적 질환		다리통증, 가슴통증, 실신, 눈주위부종, 얼굴홍조, 온감, 통증, 폐결핵	피로, 다리통증, 가슴통증, 실신, 눈주위부종, 얼굴홍조, 통증
정신질환		망상, 수면장애, 공격성, 기억상실증, 기억장애, 무기력, 잠꼬대, 정신성적장애	수면장애, 공격성, 기억장애, 무기력, 잠꼬대
중추 및 말초신경계 장애		피부저림, 보행장애, 진전, 동갈현상, 사지말림, 간대칭근경련증, 다리경련, 다변증, 떨림, 말더듬증, 반혼수, 발생장애, 상대마비, 안구운동발작, 언어 장애, 척추관협착, 파킨슨증악화	악화된진전, 피부저림, 보행장애, 진전, 사지말림, 간대칭근경련증, 다변증, 떨림, 반혼수, 안구운동발작, 언어장애, 파킨슨증악화
		투여부위 장애	국소염증
피부와 부속기관 장애		가려움증, 두드러기, 눈가림피 부질환, 홍기(생식기 제외), 탈모	가려움증, 두드러기, 홍기(생식기 제외), 탈모
혈관질환		경막하출혈	-
홍조, 출혈, 오통 장애		타박상	-
호흡기계 질환		가래역류, 가래증가, 감기, 기면저림, 폐렴	-
위장관계 장애	가슴쓰림	-	
	전신적 질환	전신쇠약, 피로	전신쇠약
중추 및 말초신경계 장애	악화된진전	-	

- 이 약의 MAO-B 억제에 대한 선택성은 용량이 권장 용량을 초과해서 증가할 때, 용량 의존적으로 감소합니다.
- 혹색증: 임상 개발 프로그램 동안 혹색증 사례가 발생하여 이 약의 투여와 연관성이 있는지 여부를 검토하였습니다. 역학적 조사 결과, 파킨슨병 자체가 혹색증을 비롯한 피부암 발생 위험의 증가와 관련 있는 것으로 추정되었습니다. 혹색증에 대한 정기적인 모니터링을 권장하며, 의심스러운 피부 병변 발생 시, 반드시 전문의에게 상담해야 합니다.
- 운동이상증: 이 약은 레보도파의 병용요법으로 투여하는 경우, 운동이상증을 유발하거나 도파민성 부작용을 증가시키며, 기존의 운동이상증을 악화시킬 수 있습니다. 이러한 부작용은 레보도파 용량을 감소하면 개선될 수 있습니다.
- 저혈압: 이 약을 레보도파와 함께 사용한 몇몇 환자에서 저혈압 사례가 보고되었으며, 파킨슨병 환자는 기저 보행장애가 있으면 특히 저혈압의 이상반응이 발생하는 경우 특히 위험할 수 있습니다.
- 중증조절장애: 도파민 효능제 및 도파민성 치료를 받은 환자에서 중증조절장애가 나타날 수 있으므로, 이 약을 투여하는 환자는 중증조절장애의 발달과 관련하여 정기적으로 모니터링 받아야 합니다. 환자 및 보호자는 이 약을 복용할 때 감각행위, 감각이상, 병적 도박, 성욕 증가, 성욕과다증, 충동적 행동, 강박적 소비 또는 구매를 포함한 중증 조절장애의 행동 증상이 나타날 수 있음을 인지하여야 합니다.
- 간장애 환자: 경증(C_{Cr} 50–80mL/분) 및 중증증(C_{Cr} 30–49mL/분) 신장애 환자에서 이 약의 약동학적 특성은 건강한 피험자와 유사하였습니다. 이들 환자에서 용량조절은 요구되지 않습니다. 이 약은 중증 신장애 환자에서 폐기되지 않습니다.
- 이 약은 운전 및 기계 조작 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 환자는 이 약이 운전 및 기계 조작에 부정적인 영향을 끼치지 않는다는 것이 확인된 때까지, 자동차를 포함한 위험한 기계를 다룰 때 주의해야 합니다. 이 약을 복용하면서 졸음이나 갑작스런 수면을 경험했다거나, 복용 전에 그러한 경험이 있는 환자는 운전, 기계 조작, 또는 높은 지점에서의 활동 등 주의집중이 저하될 경우 본인이나 타인에게 부상 또는 사상을 초래할 위험이 있는 활동을 피해야 합니다. 이 약을 진정제, 음주, 다른 중추신경억제제(벤조디아제핀, 항정신병, 항우울제 계열 약물 등), 또는 이 약의 혈중농도를 상승시키는 약물(시프로플록사신 등)과 함께 복용하는 경우 추가적인 작용이 나타날 수 있으므로 주의해야 합니다.
- 낮 시간 동안의 과도한 졸음 및 갑작스런 수면: 이 약은 낮 시간 동안의 졸림과 졸음을 유발할 수 있으며 때때로, 특히 다른 도파민성 치료제와 함께 복용하였을 경우 일상적인 활동 도중 수면에 빠질 수 있습니다. 환자는 이러한 사항과 함께, 이 약을 복용하는 동안 운전이나 기계 조작을 하는 경우 주의하도록 설명받아야 합니다. 또한 졸음이나 갑작스런 수면을 경험했다면 환자는 운전이나 기계 조작을 피해야 합니다.

4. 상호작용

- 고혈압 위기를 유발할 수 있는 비선택적 MAO-B 억제제의 위험 증가 때문에 다른 MAO 억제제(차별없이 복용 가능한 의약품(예, St. John's Wort)) 포함과 병용 투여하는 안 됩니다.
- 페티딘과 MAO 억제제(다른 선택적 MAO-B 억제제 포함)를 병용 투여한 경우 중대한 이상반응(메틸레노페티딘)이 보고되었습니다.
- 트라미adol을 MAO 억제제와 병용 투여시 중추 흥분이 나타나면서 설사, 빈맥, 발한, 진전, 착란, 심저야 혼수상태 등의 세로토닌 증후군을 이기할 수 있습니다.
- 렉스토메타르를 MAO 억제제와 병용 투여시 이 약의 흥분, 정신적란 등이 나타났다는 보고가 있습니다.
- 임상시험에서 이 약과 교감신경흥분제를 병용 투여하는 것은 허용되지 않았습니다. 교감신경흥분제와 비선택적 MAO 억제제를 병용투여한 경우, 중증의 고혈압 반응이 나타났습니다. 권장용량의 선택적 MAO-B 억제제와 교감신경흥분제(에페드린)를 병용투여한 환자에서 고혈압 위기가 1건 보고되었습니다. 이 약과 교감신경흥분제(테트라하이드로롤린)가 함유된 점안액을 병용 투여한 환자에서 혈압 상승이 보고되었습니다. 이 약과 비강, 경구 및 안과용 충혈제거제나 감기약과 같은 교감신경흥분제의 병용 투여는 권장되지 않습니다.
- MAO 억제제를 SSRIs(비선택적 세로토닌 재흡수 억제제), SNRIs(세로토닌 - 노르아드레날린 재흡수 억제제), 삼환제 또는 사환제 항우울제와 병용하는 경우 중대한 이상반응이 발생할 수 있으므로 알려져 있습니다. 시판 후 조사에서, 이 약과 항우울제를 병용한 환자에서 초조, 착란, 경직, 발열 및 간대생검결과 나타내는 세로토닌 증후군이 발생하였습니다. 이 약의 임상 시험에서 플루옥세틴이나 플루복사민을 병용 투여하는 것은 허용되지 않았습니다. 다음과 같은 항우울제를 병용 투여하는 것은 허용되었습니다: 아미트립틸린 ≤ 50 mg/일, 트라조돌 ≤ 100 mg/일, 시탈로프람 ≤ 20 mg/일, 설텔립린 ≤ 100 mg/일, 파록세틴 ≤ 30 mg/일, 임상시험 중 115명의 환자가 이 약과 삼환제 약물을, 141명의 환자가 SSRIs/ SNRIs를 약물을 병용 투여하였으며, 이 중 세로토닌 증후군이 발생한 사례는 없었습니다. 그러나 이들 약물을 병용투여시 임상 반응의 가능성을 배제할 수 없으므로, 이 약과 항우울제의 병용투여는 피해야 하며, 이 약의 투여를 중지하고 최소 14일이 경과한 후에 항우울제의 투여를 시작합니다. 플루옥세틴 등 반감기가 긴 항우울제는 투여를 중단한 후 최소 5주까 경과한 후에 이 약의 투여를 시작해야 합니다.
- 보조요법으로 레보도파를 만성적으로 투여해온 파킨슨병 환자에서, 레보도파 투여는 라사길린 클리어런스에 임상적으로 유의한 영향을 주지 않는 것으로 나타났습니다.
- In vitro 대사 시험에서 cytochrome P450 1A2 (CYP1A2)가 이 약의 대사에 관여하는 주 효소임을 확인하였습니다. 이 약과 시프로플록사신(CYP1A2의 억제제)을 병용 투여 시 이 약의 혈중농도-시간곡선하면적(AUC)이 83% 증가하였습니다. 이 약과 티오몰린(CYP1A2의 기질)의 병용투여는 서로의 약동학에 영향을 주지 않았습니다. 따라서 강력한 CYP1A2 억제제는 이 약의 혈중 농도를 변경할 수 있으므로 주의해서 투여해야 합니다.
- 흡연환자는 대하 효소 CYP1A2 유도으로 인해 이 약의 혈중 농도가 감소할 위험이 있습니다.
- In vitro 시험에서 라사길린 1 μg/mL (1 mg 라사길린 1반복 투여 후 파킨슨병 환자에서 평균 최고혈중농도(C_{max})는 약 5.9–8.5 ng/mL였고, 1 μg/mL이 이 약의 160배에 해당합니다.)은 cytochrome P450의 동중효소들(CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4, CYP4A)을 저해하지 않았습니다. 이 결과는 라사길린의 치료농도(therapeutic concentration)에서 라사길린이 이러한 효소의 기질을 임상적으로 유의하게 저해할 가능성이 없음을 나타냅니다.
- 라사길린과 엔타카폰의 병용투여 시 라사길린의 경우 클리어런스가 28% 증가하였습니다.
- 티라민/라사길린 상호작용: 식사후 혈압을 집에서 모니터링한 결과 (티라민 제한 없이 6개월간 레보도파에 대한 보조요법으로 라사길린 0.5 또는 1 mg/일 또는 약약을 복용한 464명)의 환자를 포함한 5개의 티라민 철회지 시험 결과(자이자 및 파킨슨병 환자 대상)와 티라민 제한 없이 진행된 임상시험에서 시험 결과(자이자 및 파킨슨병 환자 대상)와 티라민 제한 없이 진행된 임상시험에서 시험 결과(자이자 및 파킨슨병 환자 대상)를 포함한 임상시험에서 라사길린 1mg/일과 라사길린 상호작용에 대한 보고가 없었습니다. 따라서 이 약을 권장용량으로 투여하는 동안, 티라민 시제제한은 일반적으로 요구되지 않습니다. 그러나 매우 과량(예, >150 mg)의 티라민을 함유한 음식들은 티라민에 대한 감수성을 증가시켜 권장용량에서도 고혈압반응을 일으킬 수 있습니다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 임부
 - 이 약을 임부에 사용된 임상자료는 없습니다. 동물시험에서는 수태능, 배태자발성, 출산 또는 출생 후 발생에 대해 직접 또는 간접적으로 해로운 영향을 미치지 않았습니다. 이 약을 임부에 투여할 때는 주의해야 합니다.
- 수유부
 - 이 약은 프로락틴 분비를 저해하여 수유를 방해할 수 있다는 시험결과가 있습니다. 이 약이 사람에게 무요로 이행되는지는 알려지지 않았습니다. 이 약을 수유부에 투여할 때는 주의해야 합니다.

6. 소아에 대한 투여

18세 이하의 소아에 대한 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않습니다.

7. 고령자에 대한 투여

65세 이상 고령자에 대한 용량조절은 요구되지 않습니다.

8. 과량투여시의 처치

- 중상
 - 이 약을 3mg ~ 100 mg 과량 투여한 후 보고된 증상은 경증증, 고혈압 위기 및 세로토닌 증후군이었습니다. 과량투여에 의한 증상은 MAO-A 및 MAO-B 모두를 유의하게 억제하는 것과 관련이 있습니다. 단회 투여 시 시험에서 건강한 지원자는 20 mg/일로 이 약을 투여했고, 10일 반복 투여 후에는 10 mg/일로 투여하였습니다. 이상반응은 경미하며 중증도 이었고 이 약 투여하는 관련이 없었습니다. 만성적으로 레보도파 치료 중인 환자에게 라사길린 10 mg/일을 투여한 용량증가시험(dose escalation study)에서 심혈관적 부작용(고혈압 및 체위성 저혈압 포함)이 보고되었고, 투여 중단 시 해결되었습니다. 이 증상들은 비선택적 MAO 억제제에서 관찰된 것과 유사할 수 있습니다.
- 처치
 - 이 약의 특별한 해독제는 없습니다. 과량 투여한 경우, 환자를 관찰하고 적절한 대증적 보조요법(symptomatic and supportive therapy)을 시행해야 합니다.

9. 보관 및 취급상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 1~25°C에 보관합니다.
- 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의합니다.

10. 전문가를 위한 정보

- 약리작용
 - 약물치료학적 분류
 - 파킨슨병 치료제, 모노아민 산화효소 B (MAO-B) 억제제, ATC 코드: N04BD02
- 작용기전
 - 이 약은 강력한 비가역적인 선택적 MAO-B 억제제로서 뇌의 신경조 (striatum)에서 세로이 도파민 농도를 증가시키며, 이에 따른 도파민 활성의 상승은 이 약의 효능을 매개하는 것으로 보입니다. 주요 활성 대사물질인 1-aminoindan의 경우 MAO-B 억제제로서의 작용은 없습니다.
- 약학학적 정보
 - 흡수
 - 이 약은 신속히 흡수되며 약 0.5시간에 최고혈중농도 (C_{max})에 도달합니다. 이 약의 단회투여 시 절대 생체이용률은 약 36%입니다. 흡수 속도는 고자방식이의 경우 이 약의 C_{max} 및 혈중농도-시간곡선하면적 (AUC)을 각각 60% 및 20%씩 감소시키지만 최고혈중농도 도달시간 (T_{max})에는 영향을 미치지 않습니다. AUC는 그 정도 영향받지 않으므로, 이 약은 식사와 관계없이 복용할 수 있습니다.
 - 분포
 - 이 약의 단회 정맥투여 시 평균 분포용적 (V_d)은 약 243 L입니다. 이 약의 14C 치환체를 단회 경구투여시 혈장:뇌백 결합율은 약 60~70%입니다.
 - 대사
 - 이 약은 간에서 거의 완전한 생체 내 변환을 거친 후 배설됩니다. 이 약의 두 주요 대사경로는 N-dealkylation 및 hydroxylation으로 1-Aminoindan, 3-hydroxy-N-propargyl-1 aminoindan, 및 3-hydroxy-1-aminoindan으로 변환되며, 생체 외 시험에서 CYP450에 의존적인 것으로 나타났습니다 (주요 동중효소는 CYP1A2). 이 약 및 대사체들의 결합을 통한 glucuronides의 생성은 주요 배설 경로인 것으로 확인되었습니다. 이 약은 생체 외 세로시험과 시험관 내 시험에서 주요 CYP450 효소들에 대한 억제제나 유도제로서 작용하지 않는 것으로 나타났습니다.
 - 배설
 - 이 약의 14C 치환체를 단회 경구투여시 주 노 (62.6%), 2차적으로 대변 (21.8%)을 통해 배설되었고, 38일 동안의 총 회수율은 84.4%였습니다. 미변화제로서 노중 배설되는 양은 1% 미만이었습니다.
 - 선형성
 - 이 약은 0.5~2mg의 투여량 범위에서 선형적인 약동학적 특성을 나타내며, 소실 반감기는 0.6~2시간입니다.
 - 간장애
 - 경증 간장애 환자에서 이 약의 AUC 및 C_{max}는 각각 80%, 38% 증가하고, 중증증 간장애 환자에서 AUC 및 C_{max}는 각각 568%, 83% 증가하였습니다.
 - 신장애
 - 경증(C_{Cr} 50–80mL/분) 및 중증증(C_{Cr} 30–49mL/분) 신장애 환자에서 이 약의 약동학적 특성은 건강한 피험자와 유사하였습니다.

65세 이상의 고령자에서 이 약의 약동학적 특성에는 연령에 따른 영향이 거의 없었습니다.

- 임상시험 정보
 - 이 약의 효능은 4건의 임상시험을 통해 입증되었습니다: 단독요법으로서 임상시험 I, 도파민 효능제의 보조요법으로서 임상시험 II, 레보도파만 보조요법으로서 임상시험 III 및 IV. (I) 단독요법: 임상시험 I은 시험 개시 직후에 도파민성 약물을 복용하지 않았던 초기 파킨슨병 환자를 대상으로 한 이중 맹검, 무작위 배정, 대조, 평행군, 18주 시험으로, 30일 이상 안전적인 용량의 도파민 환자는 라사길린 투여 이전에 파킨슨병 약제를 복용한 경험이 없었습니다. 임상시험 I에서 총 404명의 환자가 위약 (138명), 라사길린 1 mg/일 (134명), 라사길린 2 mg/일 (132명) 군에 무작위 배정되었습니다. 환자들은 레보도파, 도파민 효능제 (dopamine agonists), 설텔라핀, 아만타딘을 복용할 수 없으나, 필요한 경우 안전적인 용량의 항콜린성 약물을 복용할 수 있도록 하였습니다. 파킨슨병의 유효기간은 평균 1년이었습다 (0~1년 범위). 1차 유효성 평가변수는 UPDRS (Unified Parkinson's Disease Rating Scale) [정신상태 (Part I) + 일상생활활동 (Part II) + 운동기능 (Part III)] 총 점수의 베이스라인 대비 변화였습니다. UPDRS는 환자 정신상태, 운동기능 및 일상생활활동 수행 능력에 관한 다항목 평가 척도입니다. 점수의 감소는 상태 개선을 의미하며, 베이스라인 대비 유의한 변화는 음수로 표시됩니다. 6개월 동안 라사길린 1mg/일 또는 2 mg/일 (1일 1회) 용량을 투여받고 다른 도파민성 치료를 받지 않은 환자들은 1차 유효성 평가변수에서 위약군보다 우월한 결과를 보였으며, 라사길린 1 mg 및 2 mg 용량의 유효성은 서로 유사하였습니다. 임상시험 I의 결과를 아래 표에 나타내었습니다. 라사길린 1 mg/일과 위약 간의 유효성에 있어 연령이나 성별에 따른 차이는 나타나지 않았습니다.

임상시험 I의 UPDRS 총 점수 변화

위약	베이스라인 점수	베이스라인 대비 종료 시험의 점수 변화	위약 대비 p-value
라사길린 1 mg	24.5	3.9	—
라사길린 2 mg	25.9	0.7	0,0001

(2) 도파민 효능제의 보조요법:

임상시험 II는 레보도파 없이 라사길린 1 mg의 도파민 효능제와의 보조요법을 연구한 이중 맹검, 무작위 배정, 위약 대조, 평행군, 18주 시험으로, 30일 이상 안전적인 용량의 도파민 효능제(로피니롤)를 평균 8 mg/일 또는 프라미펙살 평균 1.5 mg/일) 복용하고 있으나 파킨슨병 증상이 충분히 조절되지 않는 환자들을 대상으로 하였습니다. 임상시험 II에서 총 321명의 환자들이 위약 (162명) 또는 라사길린 1 mg/일 (159명) 군에 무작위 배정되어 베이스라인 이후 평가를 받았습니다. 파킨슨병의 유효기간은 평균 약 2 년이었습니다(0.1~14.5년 범위). 1차 유효성 평가변수는 UPDRS (Unified Parkinson's Disease Rating Scale) [정신상태 (Part I) + 일상생활활동 (Part II) + 운동기능 (Part III)] 총 점수의 베이스라인 대비 변화였습니다. 임상시험 II에서 라사길린 1 mg은 1차 유효성 평가변수에서 위약군보다 우월한 결과를 보였습니다(아래 표 참조).

임상시험 II의 UPDRS 총 점수 변화

위약	베이스라인 점수	베이스라인 대비 종료 시험의 점수 변화	위약 대비 p-value
라사길린 1 mg	29.8	-1,2	—
라사길린 1 mg	32.1	-3,6	0,012

*베이스라인 대비 변화가 음수일 때 UPDRS 점수의 개선을 의미합니다.

(3) 레보도파의 보조요법:

임상시험 III 및 임상시험 IV는 레보도파를 정기히 복용하고 있었으며 운동 용요 증상을 (복용각격 말기에 약화가 소진되는 "wearing off", 갑작스레거나 무작위로 약화가 소진되는 "off" 등을 포함하되 이에 국한되지 않음) 경험하고 있는 진행형 (advanced) 파킨슨병 환자를 대상으로 한 무작위 배정, 다국가 시험이었습니다. 임상시험 III은 북미 (미국, 캐나다) 지역에서 수행되었고 라사길린 0.5 mg/일 및 1 mg/일 용량을 위약과 비교하였습니다. 임상시험 IV는 유럽, 아르헨티나, 이스라엘에서 수행되었고, 라사길린 1 mg/일 용량을 위약과 비교하였습니다. 환자들은 파킨슨병의 유효기간은 평균 9년이었으며 (5개월~33년 범위), 레보도파를 평균 8년 (5개월~32년 범위) 동안 복용하고 있었으며, 운동 용요 증상이 약 3~4년 (1개월~23년 범위) 지속되고 있었습니다. 환자들은 시험에 참여하는 동안 베이스라인 직전과 특정 간격의 시험에 직면하여 파킨슨병 일기를 작성하여 24시간 동안 30분 간격으로 다음 4가지 중에서 해당하는 상태를 기록하였습니다: 운동이상증이 없거나 문제가 되는 (troublesome) 운동이상증이 있는 "ON" (비교적 양호한 운동기능) 상태, 문제가 되는 운동이상증을 동반한 "ON" 상태, "OFF" (비교적 저하된 운동기능) 상태, 수면 상태, 문제가 되는 운동이상증을 환자의 일상생활을 방해하는 운동이상증을 의미합니다. 모든 환자들은 레보도파/말탄산소스 억제제 복용에도 불구하고 진행된 파킨슨병에서 통상적으로 나타나는 운동 용요 등의 증상이 충분히 악화 조절되지 않는 상태였습니다. 말탄산소스 억제제와 함께 복용한 레보도파의 평균 용량은 약 700~800 mg/일였습니다 (150~3000 mg/일 범위). 환자들은 시험 시작 시점에서 안정적인 용량의 도파민 파킨슨병 치료제의 복용을 계속하였습니다. 두 임상시험에서 약 65%의 환자들은 추가된 효능제를 함께 복용하였습니다. 임상시험 III에서 약 35%의 환자들은 엔타카폰과 레보도파/말탄산소스 억제제를 함께 복용하였습니다. 엔타카폰을 복용하는 환자들의 다수는 도파민 효능제를 함께 복용하였습니다. 임상시험 III과 임상시험 IV의 1차 유효성 평가변수는 "OFF" 상태 평균 시간의 베이스라인 대비 변화였습니다. 임상시험 III에서 환자들은 위약 (159명), 라사길린 0,5 mg/일 (164명), 라사길린 1 mg/일 (149명) 군에 무작위 배정되어 26주 동안 시험에 참여하였고, 자체 일기부록으로 확인한 베이스라인의 "OFF" 상태 시간은 하위 평균 6.8시간이었습니다. 임상시험 IV에서 환자들은 위약(229명), 라사길린 1 mg/일 (231명), 또는 COMT (catechol-O-methyl transferase) 억제제(황성대역) 및 투약일정에 따른 레보도파/말탄산소스 억제제의 병용 ("OFF" 군에 무작위 배정되어 18주 동안 시험에 참여하고, 자체 일기부록으로 확인한 베이스라인의 "OFF"상태 시간은 하위 평균 5.6시간이었습니다).

임상시험 III과 임상시험 IV에서 라사길린 1 mg/일 용량을 운동 용요 증상을 경험하는 환자들에게 레보도파와 함께 투여 시 "OFF" 상태 시간을 위약 대비 감소시켰습니다. 라사길린 0.5 mg/일 용량에서도 유효한 "OFF" 상태 시간의 감소 효과가 나타났으며 1 mg/일 용량보다는 낮았습니다. 임상시험 IV에서 황성대역은 역시 "OFF" 상태를 위약 대비 감소시켰습니다 (아래 표 참조).

임상시험 III의 하위 평균 "OFF" 상태 시간 변화

위약	베이스라인 (시간)	베이스라인 대비 치료 기간의 변화 (시간)	위약 대비 p-value
라사길린 0,5 mg	6,0	-0,9	—
라사길린 1 mg	6,0	-1,4	0,0199
라사길린 1 mg	6,3	-1,9	< 0,0001

임상시험 IV의 하위 평균 "OFF" 상태 시간 변화

위약	베이스라인 (시간)	베이스라인 대비 치료 기간의 변화 (시간)	위약 대비 p-value
위약	5,5	-0,40	—
라사길린 1 mg	5,6	-1,2	0,0001

임상시험 III과 임상시험 IV에서 최초 6주 동안은 운동이상증이나 환각 등의 도파민성 부작용이 발생할 경우 레보도파의 강량을 허용하였습니다. 임상시험 III에서는 위약, 라사길린 0.5 mg/일, 라사길린 1 mg/일 군에서 각각 8%, 16%, 17%의 환자들이 레보도파의 용량을 각각 7%, 9%, 13% 강량하였습니다. 임상시험 IV에서는 위약과 라사길린 1 mg/일 군에서 각각 6%, 9%의 환자들이 레보도파의 용량을 각각 13%, 11% 강량하였습니다. 라사길린 1 mg/일과 위약 간의 유효성에 있어 연령이나 성별에 따른 차이는 나타나지 않았습니다.

4) 독성시험 정보

안전성시험시험, 반복투여 독성시험, 유전독성시험, 발암성시험, 생식발생 독성시험 등의 비임상시험에서 이 약이 특별한 인체에 해로운 만한 결과는 없었습니다. 배태기나 또는 간세포를 사용한 생체 외 시험에서 이 약이 유전독성을 나타낼 만한 결과는 없었습니다. 대사활성제 조사 시, 높은 세로토독성과 함께 영생체이상의 증가를 보였으나, 이 약의 치료제 용량으로는 도달하기 어려운 농도였습니다. 이 약은 사람에게 1 mg/일 투여 시 예상되는 혈중노출의 84~339배를 랫트에 전신 노출시켰을 때 발암성을 나타내지 않았으며, 144~213배를 마우스에 전신 노출시켰을 때 발암적인 기간/세포의 수증과 임종의 발생 속도가 관찰되었습니다.

저장방법 : 기밀용기, 1~25°C 보관

사용기간 : 제조일로부터 36개월 (제품 포장에 있는 사용기한 (Exp) 참조)

제품 외부 포장에 사용기한(Exp)은 0000(년)/00(월)/00(일)의 형식으로 표시됩니다. (내부 블리스터 또는 라벨에는 사용기한(Exp)이 00(월)/0000(년)의 형식으로 표시됩니다.)

포장단위 : 30정

* 사용기한이 지나거나 변질, 변태, 오염되었거나 손상된 약품은 약국개설자 및 약의약품대매처에 한하여 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

제품문의처 : 한국룬드벡㈜ 고객센터전화 (02)431-6600

수입판매자 : **한국룬드벡(주)**

서울시 송파구 올림픽로35길 137
한국광교문화회관 19층

크로포션 : **(주)한독테바**

서울시 강남구 테헤란로 132

제 조 자 : **Teva Pharmaceutical Industries Ltd.**

18, Elil Hurvitz Street, Industrial Zone, Kfar-Saba 4410202, Israel

설명서 최종개정일자: 2020. 09. 16

* 이 첨부서류 최종개정일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.lundbeck.com/kr)를 통해 확인할 수 있습니다.

* 의약품 부작용 발생 시 한국약의약품안전관리원에 피해구제를 신청할 수 있습니다 (1644-6223).

* 사용기한이 지난 약품을 사용하지 않도록 합니다.

* 첨부문서를 읽고 보관하도록 합니다.